



**Certis Belchim**

GROWING TOGETHER



## Suzbijanje korova u uljanoj repici

**Aktivna tvar:** metazaklor 500 g/L

**Formulacija:** koncentrat za suspenziju (SC)

Kultura	Doza L/ha	Karenca
Uljana repica	1,5 L/ha	Osigurana vremenom primjene

# Suzbijanje korova u uljanoj repici

Rapsan<sup>®</sup>  
500 SC

1,5 L/ha

ili

Rapsan<sup>®</sup>  
+  
500 SC  
Clematis

1,25-1,5 L/ha

0,25-0,33 L/ha

ili

Rapsan<sup>®</sup>  
+  
DEVRINOL<sup>45 FL</sup>


1,25 L/ha

1,5 L/ha

0,25 L/ha

Pantera QT 0,5-2,25 L/ha ili  
Fusilade Max 0,75-3 L/ha ili  
Grasser 0,6-1 L/ha

Nakon sjetve, prije nicanja (osim kada se Rapsan upotrijebi sam,  
on se može koristiti i u fazi 1-3 lista repice).  
Manje doze na lakšim tlima, veće doze na težim tlima.



BBCH 00-09 10 11-13 14-18 30 33 50 60 65 70 80-90

(doza zavisi od vrste i faze trava, samoniklih žita)



## Suzbijanje korova u uljanoj repici



Na istoj površini u jednoj sezoni može se koristiti najviše jedan put u tri godine!

Rapsan je zemljišni herbicid i za dobro djelovanje potrebna je dobra priprema zemljišta i ravnomjerno duboka sjetva i dobro pokriveno sjeme. Za aktivaciju Rapsana potrebna je vлага u zemljištu.

Više doze koriste se na teškim tlima i/ili sa visokom organskom tvari a niže na lakšim tlima sa malo organske tvari.

**PLODORED:** Zbog mogućnosti pojave rezidua na istu površinu 6 mjeseci ne smiju se sijati odnosno saditi lisnato povrće i kelj pupičar. Ostale kulture mogu se sijati 6 mjeseci nakon uporabe Rapsana time da se preporučuje obrada zemljišta do dubine najmanje 15 cm.

U slučaju propadanja usjeva na proljeće smiju se sijati žita, grah, grašak, krumpir, kukuruz, lan i kupusnjače osim kelja pupičara.



# Suzbijanje korova u uljanoj repici



Za uljanu repicu na raspolaganju je mali broj aktivnih tvari. Metazaklor (sam ili u kombinaciji sa drugim aktivnim tvarima) predstavlja osnovu odnosno glavni alat za suzbijanje korova u uljanoj repici.

Rapsan se koristi prije nicanja što znači najbolje do 48 sati nakon sjetve ako ima dovoljno vlage za brzi ponik ili i malo kasnije u sušnjim uvjetima kada je nicanje repice sporo.

U slučaju kad se nakon sjetve očekuju nepovoljni uvjeti (suša ili vrlo intenzivna kiša), RAPSAN se može koristiti i nakon nicanja kad repica ima najmanje puno razvijene kotiledone odnosno u fazi 1-3 prava lista. Rapsan je registriran i za primjenu do 9 lista uljane repice: u tim kasnijim terminima primjeniti Rapsan samo ako je usjev u dobroj kondiciji a vremenski uvjeti normalni.

# Suzbijanje korova u uljanoj repici (učinkovitost po korovima)

**>85%**

- Polygonum convolvulus*
- Stellaria media*
- Amaranthus retroflexus*
- Lamium spp*
- Matricaria spp*
- Senecio vulgaris*
- Solanum nigrum*
- Aphanes arvensis*
- Veronica hederifolia*
- Veronica persica*
- Veronica arvensis*
- Apera spica-venti*
- Poa annua*

**70-85%**

- Anthemis arvensis*
- Chenopodium album*
- Sonchus arvensis*
- Myosotis arvensis*
- Papaver rhoeas*
- Veronica agrestis*
- Alopecurus myosuroides*

**50-70 %**

- Capsella bursa-pastoris*
- Galium aparine*
- Geranium dissectum*
- Viola arvensis*



## Suzbijanje korova u uljanoj repici

 **Rapsan<sup>®</sup> 500 SC** 1,25-1,5 l/ha  
+ **Clematis** 0,25-0,33 l/ha

Clematis dopunjuje spektar djelovanja Rapsana:

- Najznačajnija dodatna prednost je odlično suzbijanje prljepače (*Galium aparine*) i rusomače (*Capsella bursa-pastoris*) i dodatno suzbijanje drugih krstašica kao što su poljska čestika (*Thlaspi arvense*) i vrste *Syimbrium spp.* ...

Clematis je zemljišni herbicid i traži dobru pripremu zemljišta i dobro prekriveno posijano sjeme ali:

- U grupi zemljišnih herbicida je jedan od najotpornijih na sušu

Uporaba isključivo prije nicanja uljane repice!



# Suzbijanje korova u uljanoj repici



 **Rapsan®  
+ 500 SC** 1,25 l/ha  
 **DEVRINOL<sup>45FL</sup>** 1,5 l/ha  
 **Clematis** 0,25 l/ha

Trojna kombinacija je najkompletnije rješenje u uljanoj repici:


- Sa dodavanjem Devrinola spektar djelovanja je iznimno širok i djelovanje na brojne korove pojačano (najznačajnija su pojačanja na *Matricaria spp.*, *Apera spica-venti*, *Geranium dissectum*, *Veronica spp.*, *Papaver rhoeas*, idr.)
- Sa jednim prskanjem najkompletnije suzbijanje, najčešće nema potrebe za korekcije
- Rješenje koje najmanje zavisi od tipa tla, vlage u tlu, kvalitete pripreme tla
- Omjer između aktivnih tvari omogućuje doze koje osiguravaju optimalnu selektivnost za uljanu repicu
- Djelovanje malo zavisi od tipa tla stoga doza se određuje primarno na osnovi vrste prisutnih korova i intenzivnosti zakorovljenosti

Uporaba isključivo prije nicanja uljane repice!

# Suzbijanje samoniklih žitarica i trava u uljanoj repici

Najprikladnije vrijeme suzbijanja je još u jesen kada se mogu koristiti niže doze (rane razvojne faze korova) a konkurenca korova nanosi velike štete!

Pantera QT 0,5-2,25 L/ha ili  
Fusilade Max 0,75-3 L/ha ili  
Grasser 0,6-1 L/ha  
*(doza zavisi od vrste i faze trava, samoniklih žita)*



# Korekcijska prskanja protiv širokolistnih korova u uljanoj repici



- Suzbijanje korova sa klopiralidom


- **Dobro se suzbijaju:**

*Ambrosia artemisiifolia, Matricaria chamomilla, Anthemis arvensis, Vicia spp., Stellaria media, Chenopodium album, Polygonum persicaria, Cirsium arvensis*

- **Smanjivanje zakorovljjenosti sa:**

*Galium aparine, Convolvulus arvensis, Sonchus spp., Polygonum aviculare*

**Pripravci na osnovi klopiralida  
najkasnije do otvaranja  
cvjetnih pupova**





**Certis Belchim**  
GROWING TOGETHER

[www.CertisBelchim.hr](http://www.CertisBelchim.hr)