



Belchimove preporuke za voćarstvo

Izgledi za ovogodišnju sezonu u voćarstvu su povoljni. Hladnije vrijeme u ovo doba dobra je perspektiva da vegetacija u voćnjacima neće krenuti prerano, a samim time opasnost od mrazeva je dosta mala. Stoga je još važnije da voćari dobro promisle o mjerama zaštite te da što bolje iskoriste potencijal rodnosti u povoljnoj godini i osiguraju kvalitetan prinos.

Sad je vrlo blizu vrijeme da se obave rana proljetna prskanja voćnjaka za koja Belchim nudi nekoliko pripravaka:

Ovitex

Koristite Ovitex - parafinsko ulje

Rano prskanje parafinskim uljem vrlo je važno za smanjenje brojnih prezimljavajućih oblika štetnika u voćnim nasadima, jer uvelike umanjuje reproduktivni potencijal mnogih štetnika od samog početka, te se time znatno olakšava njihovo suzbijanje tijekom vegetacije. **OVITEX** je visokokvalitetno parafinsko ulje koje djeluje kontaktno i stvara netoksični film. Prekriva štetnike tankim, nepropusnim premazom i tako zaustavlja dotok kisika (gušenje). Djeluje na pokretne i nepokretne oblike štetnika, uključujući jaja i ličinke. Registriran je za jabučasto i koštičavo voće, citrusa i neke druge kulture. Može se koristiti u organskoj proizvodnji!



[Više o Ovitexu](#)

Airone SC CHAMPION® WG 50

Rana upotreba bakra.

Bakarni pripravci koriste se gotovo u svim kulturama. Među najvažnijim kulturama su svakako voćne vrste. Bakar ima širok spektar djelovanja, posebno na plamenjače i druge bolesti, npr. krastavost, bakterioze idr.. Bakreni pripravci djeluju nespecifično, na više mjesta metabolizma, pa za razliku od organskih fungicida ne postoji opasnost od rezistencije na bolesti. U voćarskim kulturama preporuka je da se bakar koristi već rano na samom početku vegetacije. Belchim nudi dva bakarna pripravka: Champion 50 WG i Airone SC.

Champion WG 50 je bakarni pripravak na osnovi bakarnog hidroksida koji je već dugo prisutan na tržištu. Za voćarstvo je registriran u jabučastom, koštičavom i orašastom voću.

[Više o Championu WG 50](#)



AIRONE SC je vrlo praktična visokokvalitetna tekuća formulacija koja sadrži bakar u dva oblika :

- hidroksidni oblik ima brzo inicijalno djelovanje
- oksikloridni oblik nudi produženo djelovanje

U usporedbi s drugim bakarnim pripravcima sadrži čestice ujednačenije veličine, ima puno više čestica manjih od 1 μ što je osnova za:

- Smanjeno ispiranje kišom
- Manje doze za punu učinkovitost
- Brzo i ravnomjerno dispergiranje

AIRONE SC je registriran za sve značajne voćarske kulture u Hrvatskoj: jabučasto, koštičavo i orašasto voće, citrusi, maslina, lijeska, kivi.

[Airone SC - više o proizvodu](#)

SULGRAN

Sumpor je standardno sredstvo za suzbijanje pepelnica a ima i korisno djelovanje na grinje. Belchim nudi sumporni pripravak u WG formulaciji **SULGRAN**. U voćarstvu se u Hrvatskoj može koristiti u jabuci, breskvi i nektarini. Sumpor je vrlo važno koristiti rano na samom početku vegetacije! Koristi se i kasnije u sezoni, no u voćarstvu **SULGRAN** u jednoj vegetaciji se može koristiti najviše 3 puta.

Chikara

Zaštitu od korova treba započeti rano na početku sezone. **CHIKARA** je sulfonil urea herbicid (djelatna tvar flazasulfuron) vrlo širokog spektra koji djeluje pretežno preko tla ali se usvaja pogotovo od strane mladih korovskih biljaka i preko lista. **CHIKARA** ima najduže djelovanje od svih herbicida dozvoljenim u voćnjacima i vinovoj lozi, zbog toga sa upotrebom **CHIKARE** smanjuje se broj potrebnih prskanja herbicidima u vegetaciji. U Hrvatskoj **CHIKARA** u voćarstvu može se koristiti u agrumima i maslini.

Osnovne preporuke:

- Da se prska što ranije kada nema izniklih korova odnosno tek počinju da niču. Kada se **CHIKARA** primjeni prije nicanja korova treba planirati kasniju upotrebu folijarnog herbicida (npr. glifosat) koji suzbija neke korove koji ostaju nakon prskanja **CHIKAROM**.
- **CHIKARA** zadovoljavajuće djeluje na iznikle korove najviše do visine 10 cm.
- Ako su u vrijeme inicijalnog prskanja sa **CHIKAROM** korovi već iznikli, obavezno kombinirati **CHIKARU** folijarnim herbicidima preporučenim za određenu kulturu (npr. glifosat).

[Više o Chikari](#)



Što raditi kasnije u sezoni?

Razmislite već sada koje ćete korake poduzeti kada vegetacija bude u punom jeku. Belchim ima rješenja za većinu ključnih problema u voćarstvu. U nastavku su neke ključne informacije i preporuke za naše voćarske preparate.



Krastavost

Krastavost je najvažnija bolest jabuke i kruške. ALCOBAN je fungicid na osnovi ditanona koji je danas najzastupljenija djelatna tvar u programima zaštite od krastavosti jabuke i kruške.

ALCOBAN je ditanon tvrtke Globachem NV iz Belgije, koja je poznata po vrhunskoj kvaliteti svojih proizvoda, a posebno se tvrtka specijalizirala za voćarstvo.

Osnovne prednosti **ALCOBANA** u zaštiti protiv krastavosti:

- Izvrsna učinkovitost u zaštiti lišća i plodova jabuka i krušaka od krastavosti.
- Visokokvalitetna formulacija ditanona.
- Multisite' fungicid, nema rizika od razvoja rezistencije na bolesti.
- Fleksibilna uporaba, dugo razdoblje kada se **ALCOBAN** može koristiti.
- Potpuna selektivnost za jabuke i kruške.
- Ključni fungicid u integriranim programima zaštite.

Više o Alcobanu



Grinje

SHIRUDO i **MILBEKNOCK** su vrhunski akaricidi s različitim mehanizmima djelovanja i stoga su izvrsni partneri u programima suzbijanja grinja, njihovom alterniranjem u programu rizik od rezistencije grinja uvelike se smanjuje. **SHIRUDO** i **MILBEKNOCK** imaju jako dobar "knock down" učinak, s tim da je kod **SHIRUD**-a malo izraženiji, pa u programu preporučamo prvo korištenje **SHIRUD**-a. Oba dva akaricida imaju vrlo dugo djelovanje i učinkoviti su u svim fazama razvoja grinja, uključujući i jaja. **SHIRUDO** za sada je u voćarstvu u Hrvatskoj dozvoljen za jabuku a **MILBEKNOCK** za jabuku, mandarinu i naranču.

Više o Shirudu

Više o Milbeknocku

Uši

TEPPEKI je, od kada neonikotinoidi više nisu dostupni, daleko najznačajniji aficid.

Njegova svojstva i prednosti:

- Jedinstveni mehanizam djelovanja
- djeluje sistemično translaminarno
- Visoko je učinkovit na najširi spektar ušiju
- Ima vrlo dugo djelovanje (14 - 21 dan)
- Visoke temperature i svjetlost ne smanjuju mu učinkovitost
- Vrlo malo je opasan za korisne insekte pčele
- **TEPPEKI** se može primjeniti u jabučastom i koštičavom voću. Prvo prskanje preporučuje se neposredno prije cvatnje, čak i ako uši još nisu prisutne, jer njegovo dugo djelovanje omogućuje kontrolu eventualne intenzivne pojave ušiju tijekom cvatnje, kada nije dopuštena uporaba insekticida, pa je suzbijanje ušiju kasnije puno lakše. **TEPPEKI** se zatim može koristiti još dva puta jabučastom voću (tri puta u sezoni) i jedan put u koštičavom voću (dva puta u sezoni).

Više o Teppekiju

Dva visoko ekonomična
insekticida u voćarstvu

SCATTO i **SUMIALFA** piretroidni su insekticidi širokog spektra djelovanja sa vrlo povoljnom cijenom.

SCATTO je registriran u svim značajnim voćarskim kulturama u Hrvatskoj (jabučasto, koštičavo i orašasto voće, agrumi, maslina) a **SUMIALFA** može se koristiti u jabuci, krušci, breskvi i marelici.

[Više o Scattu](#)

[Više o Sumialfi](#)



Optimiziranje učinkovitosti i pouzdanosti

STICMAN je kompleksni okvašivač koji je optimiziran za korištenje sa fungicidima i insekticidima u svim uvjetima. Većina okvašivača su vrlo jednostavne formulacije ograničene funkcionalnosti pa kod njih od priprema do priprema, od situacije do situacije dolazi do problema kao što su fitotoksičnost, isticanje od lista, ispiranje sa kišom i dr.

STICMAN - ključna svojstva i prednosti:

- Povećanje kontaktne površine kapljica, bolja pokrovnost
- Povećana depozicija SZB – smanjeno oticanje s lista
- Smanjeno zanošenje škropiva – ujednačene kapljice
- Čvrsto lijepljenje na površinu lista/biljke
- Omogućuje manji broj prskanja u kišovitim uvjetima
- Pouzdanija i povećana učinkovitost SZB
- Nema nikakve opasnosti za fitotoksičnost
- Moguća uporaba smanjenih količina vode
- Dodavanjem **STICMAN**-a doze SZB se u prosjeku mogu smanjiti za 10-20% za istu učinkovitost kao sa osnovnim dozama.

STICMAN - doziranje u voćarstvu:

- Kod potrošnje vode do 200 L/ha dodati 0,1 L/ha
- Kod potrošnje vode 200-300 L/ha dodati 0,15 L/ha
- Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha
- Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha
- Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha

[Više o Sticmanu](#)

BORACTIV
AZO-SPEED

Folijarna ishrana

Za voćarstvo Belchim nudi neka ključna folijarna hraniva najvećeg francuskog proizvođača visokokvalitetnih specijalnih gnojiva AGRONUTRITION.

BORAKTIV

Jedinstven proizvod na tržištu koji omogućuje istovremenu opskrbu koncentriranim borom, molibdenom i magnezijem u stabilnom i topljivom obliku. BORAKTIV je važan u voćarstvu prvenstveno zbog poticanja rasta i cvatnje, čime se osigurava pouzdan i kvalitetan urod. Biljke upijaju hranjive tvari u BORAKTIV-u puno bolje nego iz tla (razlika je posebno velika na karbonatnim i/ili lakim tlima).

BORAKTIV je kompatibilan sa sredstvima za zaštitu bilja => sve u jednom prolazu, štedeći vrijeme. Dopuštena uporaba u ekološkoj proizvodnji.

UPOTREBA U VOĆARSTVU:

- 3 primjene prije cvatnje i 1 primjena nakon cvatnje u dozi od 2,5 L/ha

AZO-SPEED

je posebno dušično folijarno gnojivo s lignosulfonatima te sumporom i magnezijem.

Gnojivo sadrži dušik u dva oblika:

- Biljka prvo troši dušik iz uree (66%) => brza dostupnost.
- Urea formaldehid (33%) se oslobađa postupno => dugotrajna dostupnost za biljku (nekoliko tjedana).
- Zbog svojih kelatnih svojstava, lignosulfonati sadržani u **AZO-SPEED-u** poboljšavaju apsorpciju hranjivih tvari kroz lišće, smanjuju rizik od ožegotina listova i sprječavaju stvaranje kristaliziranih ostataka koji uzrokuju gubitak hranjivih tvari. Usvajanje dušika u biljku je praktički 100% pa se mogu koristiti znatno manje doze u odnosu na gnojiva bez lignosulfonata odnosno pouzdano dozirati potrebne količine dušika prema potrebama biljaka.

UPOTREBA U VOĆARSTVU:

- 1 primjena prije cvatnje i/ili 1 primjena u fazi osipanja latica u dozi od 5-10 L/ha
- 1 primjena nakon berbe, prije opadanja listova u dozi 5-10 L/ha

[Više o Boractivu](#)

[Više o Azo-Speedu](#)

[Azo-Speed i lignosulfonati](#)

[AGRONUTRITION](#)

Vaš Belchim

Za detaljnije informacije o našoj tvrtki i proizvodima kliknite na donji gumb za ulazak na našu web stranicu.

Web stranica Belchim

Kontakt:

Nikola Saić

Komercijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
+385 99 263 2157
nikola.saic@belchim.com

Ante Matić

Komercijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
+385 98 416 755
ante.matic@belchim.com

Dunja Jindra Čupić

Komercijalist – Slavonija
+385 99 527 0975
dunja.jindra@belchim.com

Ivica Luetić

Voditelj prodaje
+385 99 2310 744
ivica.luetic@belchim.com

Mr. Sc. Anton Gošnik

Direktor
+386 51 262 209
anton.gosnik@belchim.com

Ana-Mari Klasić

Logistika i prodaja
+385 1 551 0292
ana.klasic@belchim.com

Sanja Krajnović

Financije i računovodstvo
+385 1 551 0292
krajnovic@belchim.com

Milenko Varga

Komercijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
+385 91 5710 650
milenko.varga@belchim.com

Pavao Uljević

Komercijalist – Dalmacija i BiH
+385 91 4444 057
pavao.uljevic@belchim.com

Dario Dragić

Komercijalist – Slavonija
+385 99 7019 981
dario.dragic@belchim.com

Vasja Hafner

Voditelj marketinga i razvoja
+385 91 4166 555
vasja.hafner@belchim.com

Gordana Ladišić Grabušić

Logistika i nabava
+385 1 552 0860
gordana.ladistic@belchim.com

Josipa Danović

Financije i računovodstvo
+385 1 552 0860
josipa.danovic@belchim.com



Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

Pratite nas na:



[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2022 Sva prava pridržana.