



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Certis Belchim Hrvatska, Oreškovićeva 1A, 10010 Zagreb



Preporuke za uljanu repicu do otvaranja prvih cvjetova

Zima se oprašta, uskoro se očekuje brz i intenzivan razvoj usjeva uljane repice. Za optimizaciju usjeva uljane repice potrebno je pravodobno reagirati, pa evo glavne preporuke za najranije proljetne mjere u uljanoj repici s pripravcima Certis Belchima..

Uljana repica – Kompletni Certis Belchim program



Folijarna ishrana

Folijarno gnojivo **BORACTIV** je sveobuhvatan proizvod za opskrbu biljaka borom, molibdenom i magnezijem. Savršeno uravnotežena formulacija posebno je prilagođena potrebama krstašica, pa potiče obilne prinose stimulirajući rast i cvatnju usjeva uljane repice. Jedinstvena formulacija osigurava maksimalan unos kroz list, bez rizika od fitotoksičnosti, hranjive tvari se apsorbiraju za manje od 6 sati.

VRIJEME PRIMJENE:

2 primjene od 2-3 lista do početka cvatnje

DOZIRANJE:

3 L/ha pri maksimalnoj koncentraciji od 3%

Više za **BORACTIV**

Sumialfa



Suzbijanje štetnika uljane repice u proljeće

SUMIALFA sadrži esfenvalerat, koji je specifičan piretroidni insekticid sa svojstvima koja ga razlikuju od većine ostalih piretroida:

- Puna učinkovitost s manjim dozama od standardnih piretroida
- Specifična kemijska struktura molekule koja je osnova za:
 - Najjači repelentni učinak među piretroidima
 - Veću sigurnost za korisne insekte i oprašivače
 - Manja sklonost za razvoj otpornosti insekata

PRIMJENA U ULJANOJ REPICI U PROLJEĆE

- Repičin sjajnik: 0,25 L/h na početku napada, svakako prije cvatnje
- Repičin crvenoglavi buhač, repičina pipa komušarica i velika repičina pipa: 0,3 L/ha na početku napada

DODAJTE STICMAN !

U uljanoj repici insekticidi znaju često biti problematični. Razlog za to nije nužno otpornost insekata, uzročnici mogu biti:

- Za insekte u uljanoj repici koriste se kontaktni insekticidi koji teško dopiru do skrivenih mesta pupova i lista koji se razvija a isto tako djelovanje piretroida je kratko.
- Površina lista uljane repice je jako skliska što je uzročnik obilnog drifta (odticanja) škropiva s lista.

Posljedično vrlo često pripravak ne dopire kontaktno do insekta odnosno je dozacija premala. STICMAN u svim uvjetima optimizira djelovanje pogotovo kontaktnim SZB jer:

- Povećava kontaktne površine kapljica, bolja pokrovnost
- Povećava depoziciju – smanjeno odticanje s lista
- Čvrsto lijepi škropivo na površinu lista/biljke

Više za **SUMIALFU**



Sprječavanje poljeganja i ranih bolesti

U razdoblju od pojave pupova do otvaranja cvjetova (BBCH 50-60) - za to vrijeme se suzbija i sjajnik - vrši se prskanje kako bi se spriječilo poljeganje usjeva. Za to prskanje se preporučuje **ULYSSES**. Ovo prskanje također osigurava optimalno zdravstveno stanje usjeva uljane repice u ranim proljetnim razvojnim fazama.

Od početka pojave cvjetnih pupova do kraja cvatnje preporučuje se zaštita uljane repice od bijele truleži jednim ili dva prskanja, pri čemu ovisno o intenzitetu proizvodnje, osim fungicida **ULYSSES**, može iskoristiti i **ZAFTRA**. Više o tome u kasnijoj obavijesti.

ULYSSES®



ULYSSES - reguliranje rasta i suzbijanje bolesti u uljanoj repici u rano proljeće

Glavni cilj primjene fungicida ULYSSES u rano proljeće je reguliranje rasta ali ima ULYSSES i dobro djelovanje na brojne bolesti uljane repice kao što su *Sclerotinia sclerotiorum*, *Pseudocercospora capsellae*, *Pyrenopeziza brassicae*, *Alternaria brassicae*, *Phoma*, *Cylindrosporium* i *Botrytis*.

Najbolje vrijeme primjene:


od pojave pupova do otvaranja cvjetova (BBCH 50-60) – u isto vrijeme kada se suzbija sjajnik.

Doziranje:

- Mali sklop, biljke nižeg rasta, sorta otpornija na poljeganje: 0,3-0,4 L/ha
- Gusti sklop, visoke biljke, sorta osjetliva na poljeganje: 0,5-0,6 L/ha

Više za ULYSSES

Sticman®



Idealni adjuvant za fungicide i insekticide. **STICMAN** produžuje djelovanje, SZB se bolje raspodjeli po biljci, lakše dopire do skrivenih dijelova biljke i insekata, zaštićen je od ispiranja. **STICMAN** smanjuje broj potrebnih prskanja, pogotovo u kišovitim uvjetima.

DOZIRANJE U ULJANOJ REPICI

Potrošnja vode do 300 L/ha: 0,1 - 0,15 L/ha
Potrošnja vode 300-500 L/ha: 0,25 L/ha

Više za STICMAN

Vaš Belchim

Belchim Crop Protection HR je sada dio japanske tvrtke Certis Belchim

WEB stranica Certis Belchim Hrvatska

Kontakt:

Dragić Dario, dipl. ing.
Komercijalist – Središnja Slavonija
mob: 099 7019 981
email: Dario.Dragic@certisbelchim.com

Matić Ante, dipl. ing.
Komercijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
mob: 098 416 755
email: Ante.Matic@certisbelchim.com

Gošnik Anton, Mr. Sc.
Direktor
mob: +386 51 262 209
email: Anton.Gosnik@certisbelchim.com

Saić Nikola
Komercijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 099 2632 157
email: Nikola.Saic@certisbelchim.com

Hafner Vasja, dipl. ing.
Voditelj marketinga i razvoja
mob: 091 4166 555
email: Vasja.Hafner@certisbelchim.com

Uljević Pavao, dipl.ing.
Komercijalist – Dalmacija i BiH
mob: 091 4444 057
email: Pavao.Uljevic@certisbelchim.com

Jindra Čupić Dunja, dipl. ing.
Komercijalist – Istočna Slavonija I
mob: 099 5270 975
email: Dunja.Jindra@certisbelchim.com

Varga Milenko, dipl.ing.
Komercijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 091 5710 650
email: Milenko.Varga@certisbelchim.com

Klasić Ana-Mari
Logistika i prodaja
tel: 091 4166 526
email: Ana.Klasic@certisbelchim.com

Vrtarić Marko, dipl.ing.
Komercijalist – Istočna Slavonija II
mob: 099 7127 089
email: Marko.Vrtaric@certisbelchim.com

Krajnović Sanja
Računovodstvo
tel: 091 4166 550
email: Sanja.Krajnovic@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2023 Sva prava pridržana.